



CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT
Direction des Admissions et concours

ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES
E.S.C.P.-E.A.P.
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE LYON
CONCOURS D'ADMISSION SUR CLASSES PREPARATOIRES

OPTION ECONOMIQUE
MATHEMATIQUES III

Année 1999

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Les candidats sont invités à encadrer dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs.

Ils ne doivent faire usage d'aucun document : l'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

Seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.

Exercice 1

On note $\mathcal{L}(\mathbb{R}^4)$ l'ensemble des endomorphismes de l'espace vectoriel \mathbb{R}^4 , Id l'endomorphisme identique de \mathbb{R}^4 et I la matrice identité de $\mathfrak{M}_4(\mathbb{R})$. On considère les matrices :

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On désigne respectivement par φ et ψ les endomorphismes de \mathbb{R}^4 représentés par L et M dans la base canonique $\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ de \mathbb{R}^4 .

1. (a) Montrer que φ et ψ sont des automorphismes de \mathbb{R}^4 et en déterminer les automorphismes réciproques.
(b) Déterminer les valeurs propres et les sous espaces propres associés de l'endomorphisme φ .
Déterminer de même les valeurs propres et les sous espaces propres associés de ψ .
(c) Montrer que l'on peut trouver un vecteur f_1 non nul de \mathbb{R}^4 vérifiant $\varphi(f_1) = f_1$ et $\psi(f_1) = f_1$.
(d) Déterminer, plus généralement, une base $\mathcal{F} = (f_1, f_2, f_3, f_4)$ de \mathbb{R}^4 dont chaque vecteur est à la fois un vecteur propre de φ et un vecteur propre de ψ . Donner la matrice L' de φ et la matrice M' de ψ dans cette base \mathcal{F} .
2. On se propose d'étudier l'ensemble C des endomorphismes γ de \mathbb{R}^4 vérifiant $\gamma \circ \varphi = \varphi \circ \gamma$ et $\gamma \circ \psi = \psi \circ \gamma$.
 - (a) Montrer que C est un sous espace vectoriel de $\mathcal{L}(\mathbb{R}^4)$ qui contient φ et ψ .
 - (b) Montrer que si $\gamma \in C$ et $\gamma' \in C$, alors $\gamma \circ \gamma' \in C$.
 - (c) Soit $\gamma \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4)$ un endomorphisme de \mathbb{R}^4 et soit G la matrice de γ dans la base \mathcal{F} , constituée de vecteurs propres de φ et ψ , déterminée à la question 1.d). Montrer que $\gamma \in C$ si et seulement si G est une matrice diagonale.
 - (d) En déduire que C est un sous espace vectoriel de dimension 4 de $\mathcal{L}(\mathbb{R}^4)$ et que les endomorphismes Id , φ , ψ et $\varphi \circ \psi$ forment une base de C .

Exercice 2

On considère un entier naturel N supérieur ou égal à 3, et on note $\{1, 2, \dots, N\}$ l'ensemble des entiers strictement positifs, inférieurs ou égaux à N .

Une urne contient N boules numérotées de 1 à N . On y effectue des tirages successifs d'une boule avec remise de la boule tirée après chaque tirage, jusqu'à obtenir pour la première fois un numéro déjà tiré. On note alors T_N le rang aléatoire de ce dernier tirage.

C'est ainsi que, si on a obtenu successivement les numéros -1-5-4-7-3-5-, la variable T_N prend la valeur 6, alors que si l'on a obtenu -5-4-2-2- la variable T_N prend la valeur 4.

On admet qu'on définit ainsi une variable aléatoire sur un espace probabilisé, dont la probabilité est notée \mathbf{P} . Toutes les variables aléatoires introduites dans le problème seront supposées définies sur cet espace. Si Z est une telle variable, son espérance sera notée $E(Z)$ et sa variance $V(Z)$.

N.B. *Les parties II et III sont indépendantes.*

I. Etude de la variable aléatoire T_N

1. Dans cette question, on se place dans le cas particulier où l'entier N est égal à 3.
Déterminer la loi de T_3 et calculer son espérance et sa variance.
2. On revient désormais au cas général où N est supérieur ou égal à 3.
 - (a) Déterminer l'ensemble des valeurs que peut prendre T_N .

- (b) Calculer $P(T_N = 2)$, $P(T_N = 3)$, et $P(T_N = N + 1)$.
 (c) Prouver, pour tout entier k de $\{1, 2, \dots, N\}$, les égalités

$$P(T_N > k) = \frac{N!}{(N-k)!N^k} = \prod_{i=0}^{k-1} \left(1 - \frac{i}{N}\right)$$

En déduire la loi de la variable aléatoire T_N .

- (d) Déterminer, pour tout entier k fixé, la limite $\lim_{N \rightarrow +\infty} P(T_n > k)$.
 Pouvaient-on prévoir ce résultat?

II. Etude d'un algorithme

Dans le programme Turbo-Pascal suivant, la fonction RANDOM renvoie, pour un argument M de type INTEGER, un nombre entier aléatoire de l'intervalle $[0, M - 1]$.

```
PROGRAM simulation; VAR T :ARRAY[1..20001] OF INTEGER;
  U,S,i,n :INTEGER;
  coincide :BOOLEAN;

PROCEDURE X;
  BEGIN
    RANDOMIZE; {initialisation de la fonction RANDOM}
    FOR i :=1 to 20001 DO T[i] :=1+RANDOM(20000);
  END;

BEGIN
  X;
  i :=1; coincide :=FALSE;
  REPEAT
    i :=i+1;
    S :=0;
    WHILE (S<i-1) and NOT coincide DO
      BEGIN
        S :=S+1;
        IF T[S]=T[i] THEN coincide :=TRUE;
      END;
  UNTIL coincide = TRUE;
  U :=i;
  FOR n :=1 to i DO WRITELN(T[n],', ', ');
  WRITELN;
  WRITELN('U= ',U);
  WRITELN('S= ',S);
  READLN;
END.
```

- a) Que fait la procédure X ?
 b) Que représentent les variables U et S à la fin du programme ?
 c) Pourquoi est-il certain que le nombre de passages dans la boucle REPEAT ... UNTIL est fini ?

III. Etude du comportement asymptotique de la suite $(T_N)_{N \geq 3}$

1. Une formule pour l'espérance de T_N .

(a) Justifier l'égalité suivante : $E(T_N) = \sum_{k=0}^N P(T_N > k)$.

(b) En déduire l'égalité : $E(T_N) = \frac{N!}{N^N} \sum_{h=0}^N \frac{N^h}{h!}$.

2. Un résultat utile sur les lois de Poisson.

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires de Poisson indépendantes de paramètre $\lambda = 1$ et soit, pour tout entier $N \geq 1$, $Y_N = X_1 + X_2 + \dots + X_N$.

(a) Montrer par récurrence sur N , que la loi de Y_N est une loi de Poisson de paramètre N . Donner l'espérance et la variance de Y_N .

(b) Justifier l'égalité

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} P\left(\frac{Y_N - N}{\sqrt{N}} \leq 0\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^0 e^{-t^2/2} dt$$

(c) En déduire l'égalité : $\lim_{N \rightarrow +\infty} P(Y_N \leq N) = \frac{1}{2}$

3. En appliquant ce résultat, montrer que $E(T_N)$ est équivalent à $\frac{1}{2} \frac{N! e^N}{N^N}$ quand N tend vers l'infini.

4. Une expression de la variance de T_N .

(a) Montrer l'égalité $E(T_N^2) = \sum_{k=0}^N (2k+1)P(T_N > k)$.

(b) Etablir la relation $\sum_{k=0}^N kP(T_N > k) = \frac{N!}{N^N} \sum_{h=0}^N (N-h) \frac{N^h}{h!}$.

(c) Montrer l'égalité : $\sum_{h=0}^N (N-h) \frac{N^h}{h!} = \frac{N^{N+1}}{N!}$.

(d) En déduire que la variance $V(T_N)$ de T_N et son espérance vérifient la relation :

$$V(T_N) = 2N + E(T_N) - (E(T_N))^2$$

5. En admettant le résultat classique : $N! \sim N^N e^{-N} \sqrt{2\pi N}$ quand N tend vers l'infini, donner, en conclusion, des équivalents simples de $E(T_N)$ et $V(T_N)$.

* FIN *